

**Implant dentaire : racine artificielle sous forme de vis en titane placée dans l'os de la mâchoire, servant de support à une couronne, un bridge ou une prothèse amovible.**

## Quand pose-t-on un implant ?

Un implant peut être mis en place, soit immédiatement après l'extraction d'une dent, soit après la cicatrisation de l'os et de la gencive. L'acte chirurgical est souvent simple et peu douloureux. Il se fait sous anesthésie locale comme pour le traitement d'une carie.

La prothèse définitive est réalisée après la solidification de l'os autour de l'implant (dans un délai de 2 à 6 mois). Dans certaines conditions, une prothèse provisoire peut être mise en place immédiatement après la pose de l'implant.

## Indications et contre-indications

Pour poser un implant, il faut que le volume et la qualité de l'os de la mâchoire soient suffisants. Ces paramètres sont généralement évalués à l'aide d'un scanner. Cependant il est aussi possible d'augmenter le volume osseux à l'aide d'une greffe osseuse. Il est également important que les dents voisines et la gencive soient saines.

Les contre-indications absolues sont rares : il s'agit principalement d'irradiation de la face, ou de haut risque d'endocardite infectieuse (infection d'une valve du cœur par des bactéries de la bouche). Les contre-indications relatives sont plus fréquentes : mauvaise hygiène, tabac, diabète non équilibré...



### Nos conseils

- L'implant est une solution de choix car il permet de remplacer une ou plusieurs dents sans affecter les autres dents, et offre une prothèse à la fois fixe et confortable.
- Les implants ont une durée de vie de plusieurs dizaines d'années.
- Si vous êtes concerné, vous devez, comme tous les porteurs d'implants, observer une hygiène dentaire extrêmement rigoureuse et effectuer des contrôles très régulièrement.